

## NECESITO QUEDARME EN CASA SI...

TENGO FIEBRE	TENGO VÓMITO	TENGO DIARREA	TENGO SALPULLIDO	TENGO PIOJOS	TENGO INFECCIÓN DE LOS OJOS	HE ESTADO EN EL HOSPITAL	TENGO EL FLU
							
TEMPERATUR A de 100.0 F O MÁS ALTA	DENTRO DE LAS ULTIMAS 24 HORAS	DENTRO DE LAS ULTIMAS 24 HORAS	ERUPCION E EL CUERPO CON PICADURAS O FIEBRE	CABEZA QUE PICA, PIOJOS ACTIVOS	ENROJECIMIENTO , PICADO Y / O DROGACIÓN DEL PUS DESDE EL OJO	ESTADIA O VISITA A LA SALA DE EMERGENCIA	DOLOR DE CUERPO, DOLOR, CANSANCIO, DOLOR DE CABEZA, TOS, DOLOR DE GARGANTA, SECRECIÓN NASAL (puede tener vómitos, diarrea o fiebre)

## YO ESTOY LISTO PARA VOLVER A LA ESCUELA CUANDO SOY...

Libre de fiebre sin la ayuda de medicamentos durante 24 horas (es decir, Tylenol, Motrin, Advil, etc.)	Libre de vómitos durante 24 horas	Libre de diarrea durante 24 horas	Libre de sarpullido, picazón o fiebre. He sido evaluado por mi médico si es necesario.	Tratado con tratamiento de piojos apropiado en casa.	Libre de drenaje y/o ha sido evaluado por mi médico si es necesario.	Liberado por el profesional médico para regresar a la escuela.	Liberado por un proveedor médico, los síntomas desaparecieron.
--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Si su hijo tiene faringitis estreptocócica u otra infección bacteriana, debe quedarse en casa hasta que se le administre el antibiótico durante al menos 24 horas y su atención médica le haya dado permiso a su hijo para regresar a la escuela. Le recomendamos que busque atención médica cuando su hijo esté enfermo y siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica sobre regresar a la escuela y otras actividades.

**Tenga en cuenta que se seguirá la orientación de salud pública en caso de brotes o grupos inusuales de enfermedades.**